

Ein Versuch
die Fehler zu bestimmen,
welche
der Kehlkopf beim Halten eines Tones macht.

Inaugural-Dissertation,
welche
unter Zustimmung der hochlöblichen medicinischen
Facultät zu Marburg

zur
Erlangung der Doctorwürde
in der
Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe

einreicht und
mit den beigefügten Thesen
am 3. August 1872

öffentlich vertheidigen wird
A d o l p h K l ü n d e r
aus Kiel.

MARBURG.
Druck von C. L. Pfeil.

Seinem hochverehrten Lehrer

Herrn


Dr. med. et chir. E. Kirchner,

Professor der Heilmittellehre und der pharmaceutischen Wissen-
schaften an der Universität Kiel, ordentlichem Mitgliede des
Königl. schleswig-holsteinischen Medicinalcollegiums

als ein Zeichen der Dankbarkeit

gewidmet

vom Verfasser.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Es ist eine feststehende Thatsache, dass die menschlichen Organe in ihren Leistungen keine absolute Vollkommenheit erreichen und dass sie stets ein gewisses Mass von Mängeln und Fehlern bei ihren Leistungen zeigen. Dies Maas ist jedoch ein sehr geringes und so scheint namentlich auch der Kehlkopf eines mit gutem musicalischem Gehör begabten und sonst genügend ausgebildeten Menschen den von ihm verlangten Ton mit grosser Genauigkeit angeben und halten zu können.

Jedenfalls genügt diese Genauigkeit vollkommen den geforderten Zwecken und im gewöhnlichen Leben macht man niemals die Erfahrung, dass in dem richtigen Angeben und Halten eines Tones an sich besonders Schwierigkeiten zu überwinden wären. Um dies einer so grossen Leistungsfähige Organ besser zu verstehen und zu erkennen, ist es jedoch nöthig, ein möglichst genaues Mass für seine Leistungen zu gewinnen.

Da meines Wissens ein solches Mass von Niemandem gewonnen worden ist und sich in den betreffenden Schriften (Wagner, Handwörterbuch der Physiologie; Wundt, Funke, Lehrbuch der Physiologie und Helmholtz, Lehre von den Tonempfindungen) durchaus keine Angaben in dieser Richtung vorfinden, so habe ich auf Vorschlag meines hochverehrten Lehrers, des Herrn Prof. Hensen nachfolgende Versuche angestellt und möchte [ich an dieser Stelle nicht

unterlassen, demselben für die Freundlichkeit, mit welcher er mir die Apparate des Kieler physiologischen Instituts zur Verfügung stellte und mich mit Rath und That über sich mir in den Weg stellende Schwierigkeiten hinweghalf, meinen wärmsten Dank abzustatten.

Es boten sich zur Prüfung dieser Frage zwei Wege; der eine würde darin bestehen, dass man alle Tonschwingungen des Kehlkopfs aufschreiben liesse und dieselben dann vergliche mit den Schwingungen desjenigen Toninstruments, welches dem Ohre des zu untersuchenden Menschen den zu singenden Ton angiebt. Es würden also zwei Membranen, von denen die eine vom einen, die andre vom andern Ton in Bewegung gesetzt wird gleichzeitig auf einer rotirenden Trommel ihre Bewegungen zu zeichnen haben und die Häufigkeit dieser Bewegungen würde dann gezählt werden müssen und daraus würde sich ergeben, um wie viel Mal häufiger oder langsamer der Ton des Kehlkopfs in der Zeiteinheit geschwungen hat, wie derjenige Ton schwankt, welchen er zu reproduciren strebte. Da mir die Beendigung der Zählung der auf eben angegebene Weise bereits gewonnenen Curven, die ich in nächster Zeit veröffentlichen werde, nicht möglich gewesen ist, so habe ich zunächst auf eine einfachere Weise zu einem Resultat zu kommen gesucht.

Wenn zwei nahezu unisone Töne auf einen und denselben Körper wirken, so geben sie bekanntlich Stösse (Tonstösse). Diese Stösse rühren davon her, dass abwechselnd beide Tonquellen mit einander, also mit verdoppelter Kraft und dann wieder einander entgegenwirkend, also mit geschwächter Kraft den betreffenden Körper in Bewegung setzen; so oftmal ein solcher Stoss erfolgt, so oft hat die eine Tonquelle eine Bewegung mehr gemacht wie die andre und man kann also umgekehrt bei zwei einander nahestehenden Tönen aus der Anzahl der Stösse, welche sie in

der Zeiteinheit machen, auf die Differenz ihrer Schwingungsgeschwindigkeit zurückschliessen. Kennt man nun die Anzahl der Schwingungen, welche die eine Tonquelle macht, so kann man daraus die Schwingungen der zweiten Tonquelle berechnen, wenn man nur weiss, ob dieselbe höher oder tiefer wie der betreffende Ton gewesen ist. Aber auch ohne das letztere sagen zu können, kann man doch die Procente der Abweichung der zweiten Tonquelle aus den Schlägen genügend genau bestimmen, weil es einen sehr geringen Fehler in der Rechnung giebt, ob man die Procente z. B. statt für 129 für 127 oder umgekehrt berechnet. Für genauere Bestimmungen kommt alles darauf an, Apparate zu haben, welche eine möglichst deutliche Beobachtung der betreffenden Verhältnisse gestatten. Solche Apparate scheinen in den König'schen Kapseln gegeben zu sein, welche dazu bestimmt sind, die Bewegungen des Tones der Luft dem Auge, sei es durch brennende Gasflammen, sei es durch auf die Membran derselben befestigte Stäbchen sichtbar zu machen. Ich glaube dieselben hier nicht näher beschreiben zu dürfen, weil sie bereits allgemein bekannt geworden sind und in jedem neuen Lehrbuch der Physik beschrieben werden. An sie habe ich mich gehalten, da die einfache Wahrnehmung der Stösse durch das Ohr nicht prägnant genug ist.

Ich gab mir zunächst viele Mühe mit einem wie folgt eingerichteten Apparat zu arbeiten. Es wurden zwei Orgelpfeifen, die den Ton $C_3 = Ut_3$ angaben, nach dem Gehör unisono gestimmt, so dass also keine Stösse wahrnehmbar waren, darauf dieselben durch den König'schen Differenz-Apparat zwei König'schen Kapseln so zugeleitet, dass der Ton jeder Orgelpfeife gegen je eine Membran traf. Zwischen beide Membranen wurde eine möglichst leicht gearbeitete Papiertrommel geklemmt, letztere von einem sehr dünne ausgezogenen Glasstabe durchbohrt, welcher die ihm von

der kleinen Papiertrommel übertragenen Bewegungen zeichnen sollte.

Um diesen Zweck zu erreichen, wurde vor dem Glasfaden eine mit berusstem Papier überzogene und durch ein Uhrwerk getriebene eiserne Trommel in Rotation versetzt. An dem Uhrwerk war die Einrichtung getroffen, dass der Trommel eine verschieden rasche Bewegung ertheilt werden konnte, zu den nachfolgenden Versuchen jedoch diejenige als die zweckmässigste gefunden, durch welche die Trommel in der Minute eine ganze Umdrehung zu machen im Stande war. Sowie die Stimmung der beiden Orgelpfeifen eine ganz reine war, zeichnete der Glasstab auf der berussten Trommel eine gerade Linie, sobald man dieselben jedoch so stimmte, dass in der Minute circa 70 — 100 (Schläge) Stösse entstanden, so gab der Glasstab dieselben zwar gut und präzise wieder, es fanden sich jedoch noch ausserdem kleinere Zeichnungen desselben vor, die von denen der Stösse nicht gut zu unterscheiden waren. Ein fernerer Uebelstand fand sich noch an den Zeichnungen des Glasstabes, nämlich der, dass man nach denselben nicht bestimmen konnte, auf welcher Seite die höher und auf welcher die tiefer stimmende Orgelpfeife sich befand. Da nun aber, wie eben erwähnt, die Stösse von den begleitenden Schwankungen, wahrscheinlich den Eigenschwingungen des Glasstabes, nicht zu unterscheiden und erstere bei der Stimme nicht so stark, wie bei den beiden Orgelpfeifen sich markiren, wurde der Apparat in der Weise umgeändert, dass die aus dem Differenz-Apparat kommenden Töne direct einer kleinen Gasflamme zugeleitet wurden. Die Bewegungen der Flamme waren sehr präzise und deutlich, nur gelang es bis jetzt nicht, dieselben sofort zu fixiren. Um dies jedoch möglichst genau zu ersetzen, wurden zwei Stimmgabeln, die das kleine C angaben, durch electrischen Strom in Schwingung versetzt und schrieb die

eine derselben ihre Schwingungen direct auf der oben erwähnten berussten Trommel. Zu gleicher Zeit wurde die Gasflamme beobachtet und die sich als Bewegung der Gasflamme zeigenden Stösse durch einen Schlag gegen die eine Branche der Stimmgabel in den Zeichnungen der letzteren markirt.

Da nun aber für die meiner Stimme zugänglichen Töne keine durchbohrten Orgelpfeifen vorhanden waren, so wurden dieselben dadurch ersetzt, dass durch eine den gewünschten Ton angegebende Orgelpfeife ein Helmholtz'scher Resonator angesprochen und derselbe durch den einen Arm des König'schen Differenz-Apparates zur Gasflamme geleitet wurde, während in den andern Armen der zu untersuchende Ton hineingesungen wurde.

Mit dem eben beschriebenen Apparat wurden die am Schlusse angefügten Tabellen gewonnen und zwar giebt Tab. I das Resultat des Fehlers für den Ton Ut_2 , welcher in der Secunde 128 Schwingungen macht. Es zeigt die erste Zahlenreihe die Schwingungen der Stimmgabel $Ut - 1$, welche 32 Schwingungen in der Secunde macht und zwar hat zwischen je zwei aufeinander folgenden Zahlen jedesmal ein Stoss stattgefunden. In der zweiten Reihe sind die Schwingungen der Stimmgabel in die der Stimme umgesetzt und in der dritten ist der Fehler in Procent berechnet. Aus diesen 17 Versuchen wurde nun die Mittelzahl des Fehlers zu $0,761\%$ berechnet und als Durchschnittszahl des Maximum des Fehlers stellte sich $1,370\%$ heraus, während die des Minimum $0,412\%$ war.

Zusammenstellung für Ut 2.

	Max.	Min.	Mittelz.
1	1,250	0,416	0,745
2	1,041	0,490	0,746
3	1,388	0,500	0,752
4	1,470	0,735	0,913
5	1,136	0,446	0,657
6	0,893	0,416	0,676
7	0,926	0,379	0,647
8	1,315	0,342	0,714
9	0,833	0,309	0,789
10	2,083	0,296	0,687
11	1,388	0,283	0,836
12	1,785	0,463	0,694
13	1,000	0,356	0,649
14	1,136	0,403	0,760
15	1,785	0,423	0,833
16	1,785	0,490	0,857
17	2,083	0,296	0,777
17	23,297	7,043	12,932
	1,370	0,412	0,761 % des Fehl.

Tab. 2 stellt eben dieselbe Versuchsreihe für den Ton Sol₂ dar, der 192 Schwingungen in der Secunde macht.

Zusammenstellung für Sol. 2.

	Max.	Min.	Mittelz.
1	0,666	0,268	0,348
2	0,694	0,238	0,482
3	0,666	0,282	0,490
4	0,641	0,333	0,516
5	0,641	0,277	0,475
6	0,694	0,264	0,543
7	0,694	0,268	0,500
8	0,641	0,238	0,377
9	0,747	0,222	0,466
10	0,666	0,195	0,460
11	0,666	0,208	0,452
12	0,595	0,181	0,355
13	0,641	0,208	0,499
14	0,595	0,128	0,381
15	0,595	0,238	0,386
16	0,595	0,153	0,318
16	10,347	3,701	6,949
	0,647	0,231	0,434 %.

Tabelle 3 zeigt den Ton Ut_3 in derselben Weise behandelt.

Zusammenstellung für Ut_3 .

	Max.	Min.	Mittelz.
1	0,694	0,223	0,418
2	0,250	0,099	0,179
3	0,411	0,067	0,288
4	0,291	0,145	0,228
5	0,391	0,147	0,285
6	0,338	0,118	0,245
7	0,338	0,105	0,173
8	0,411	0,108	0,274
9	0,255	0,147	0,212
10	0,367	0,142	0,271
10	3,746	1,301	2,573
	0,375	0,130	0,257 %.

Vorstehende Tabellen zeigen nun, dass die Mittelzahl des Fehlers bei Ut_2 0,761 % beträgt; während die bei Sol_2 als 0,434 % sich herausstellte; bedeutend kleiner ist endlich die Fehlergrenze bei Ut_3 , die die Mittelzahl 0,257 % ergibt.

Diesen grossen Unterschied von 0,761 % zu 0,257 % im Bereich einer Octave glaubten wir im Anfang auf eine ungleiche Schärfe des Gehörs zurückführen zu müssen; nach angestellten Versuchen jedoch ergab sich, dass dieselbe in der Höhe und Tiefe fast gleich, da die Genauigkeit sich bei Ut_2 , mit 128 Schwingungen in der Secunde, und La_3 , mit 430 Schw., wie 1001,56 zu 1001,54 herausstellte.

Es ergibt sich also, dass der Grund, weshalb höhere Töne so viel genauer von unserm Kehlkopf angegeben und gehalten werden, von dem Kehlkopf selbst und nicht von

unserm Gehör abhängig sein muss. Da nun bei tieferen Tönen diejenigen Muskel, welche die Stimmritze anzuspannen und zu verengen haben, weniger contrahirt sind als wenn höhere Töne angegeben werden, so scheint es, dass unsere Nerven leichter die Muskel in genau derselben Spannung zu erhalten im Stande sind, wenn die Muskel in starker Contraction gebracht werden, als wenn sie dieselben fort-dauernd in gleichmässiger aber relativ schwacher Contraction zu halten haben. Sollte sich diese Anschauung durch weitere Versuche als richtig herausstellen, so wäre dadurch auch für die Kenntniss der allgemeinen Muskellehre des Körpers ein neues Factum von einigem Interesse gewonnen.



Verfasser dieses, Adolph Fr. Th. Klünder, geboren zu Kiel den 26. Mai 1846, evangelischer Confession, Sohn des Musikus J. F. Klünder in Kiel, besuchte die Kieler Gelehrten-Schule, wurde im August 1866 auf der Königl. Christian Albrechts Universität immatriculirt, bestand am 18. December 1869 das Tentamen physicum, wurde am 31. December 1870 behufs Meldung zum medicinischen Staatsexamen exmatriculirt, fungirte vom 13. August 1870 bis Januar 1871 als Assistenzarzt an der Königl. Hebammenlehr- und Gebäranstalt zu Kiel und wurde in Folge erhaltenen Schreibens des Provinzial-General-Arztes Herrn Dr. Köhler zum Unterarzt mit Wahrnehmung der Assistenzarztstelle bei dem Ersatz-Bataillon, Magdeburgischen Füsilier-Regiments Nr. 36 am 28. December 1870 ernannt, in welcher Stellung derselbe bis zu seiner Entlassung in Erfurt am 23. Juli 1871 thätig war. Im April d. J. begann derselbe vor der hies. hochlöblichen Prüfungscommission das medicinische Staatsexamen, bestand dasselbe bis auf die medicinische Station, welcher derselbe sich nicht unterziehen konnte, da der Prüfungstermin inzwischen verflossen. Am 23. Juli bestand er das Examen rigorosum.

T h e s e n.

I.

Die Hasenscharte ist sogleich nach der Geburt zu operiren.

II.

Bei der Behandlung der Peritonitis mit Eis und Opium ist die Darreichung des Opium in Form von Suppositorien die beste Methode.

III.

Durch consequente Seitenlage kann die Heilung selbst grosser Perinaealrupturen auch ohne Nath per primam intentionem erfolgen.

Ut 2 = 128 Schw.

1	46 184 0,543	33 132 0,757	37 148 0,675	45 180 0,555	20 80 1,250	25 100 1,000	26 104 0,961	20 80 1,250	60 240 0,416	36 144 0,694	35 140 0,714	47 188 0,532	39 146 0,684	50 200 0,500	27 108 0,926	53 212 0,471							
2	46 184 0,543	38 152 0,657	50 200 0,500	44 176 0,568	51 204 0,490	24 96 1,041	25 100 1,000	30 120 0,833	25 100 1,000	30 120 0,833													
3	40 160 0,625	43 172 0,581	38 152 0,657	50 200 0,500	28 112 0,893	24 96 1,041	48 192 0,521	45 180 0,555	35 140 0,714	30 120 0,833	27 108 0,926	35 140 0,714	18 72 1,388	43 172 0,581	50 200 0,500								
4	18 72 1,388	56 224 0,446	29 116 0,862	34 136 0,735	32 128 0,781	23 92 1,086	26 104 0,961	26 104 0,961	26 104 0,961	30 120 0,833	35 140 0,714	43 172 0,581	17 68 1,470	22 88 1,136	32 128 0,781								
5	30 120 0,833	50 200 0,500	41 164 0,609	32 128 0,781	32 128 0,781	58 232 0,431	36 144 0,694	46 184 0,543	42 168 0,593	40 192 0,625	48 204 0,521	51 152 0,490	38 152 0,657	22 88 1,136									
6	42 168 0,593	60 249 0,416	46 184 0,543	32 128 0,781	42 168 0,593	42 168 0,593	32 128 0,781	28 112 0,892	36 144 0,694	34 136 0,735	36 144 0,694	43 172 0,581	28 112 0,892										
7	34 136 0,735	40 160 0,625	52 208 0,480	48 192 0,521	46 184 0,543	26 104 0,961	40 160 0,625	27 108 0,926	28 112 0,892	37 148 0,675	38 152 0,657	38 152 0,657	66 264 0,379	51 204 0,490	44 176 0,568	40 160 0,625							
8	45 180 0,555	31 124 0,807	44 176 0,568	36 144 0,694	23 92 1,086	37 148 0,675	32 128 0,781	34 136 0,735	19 76 1,315	73 292 0,342	40 160 0,625	31 124 0,807	39 156 0,641	40 160 0,625	43 172 0,581	42 168 0,593							
9	30 120 0,833	34 136 0,735	80 320 0,309	30 120 0,833	32 128 0,781	36 144 0,694	30 120 0,833	35 140 0,714	48 192 0,521	40 160 0,625	31 124 0,807												
10	38 152 0,657	38 152 0,657	40 160 0,625	12 48 2,083	45 180 0,555	45 180 0,555	42 168 0,593	43 172 0,581	46 184 0,543	79 316 0,316	84 336 0,296	47 188 0,532	47 188 0,532	44 176 0,568	42 168 0,593	39 156 0,641	29 116 0,862	24 96 1,041	30 120 0,833				
11	36 144 0,694	32 128 0,781	32 128 0,781	45 180 0,555	52 208 0,480	88 352 0,283	20 80 1,250	32 128 0,781	26 104 0,961	20 80 1,250	18 72 1,388												
12	32 128 0,781	45 180 0,555	40 160 0,625	54 216 0,463	14 56 1,785	48 192 0,521	38 152 0,657	72 288 0,347	38 152 0,657	43 172 0,581	40 160 0,625	31 124 0,807	52 208 0,480	30 120 0,833									
13	37 148 0,675	43 152 0,581	50 200 0,500	52 208 0,480	70 280 0,356	38 152 0,657	52 208 0,480	25 100 1,000	26 104 0,961	31 124 0,807													
14	33 132 0,757	46 184 0,543	30 120 0,833	62 248 0,403	38 152 0,657	35 140 0,714	34 136 0,735	35 140 0,714	38 152 0,657	30 120 0,833	28 112 0,893	29 116 0,862	32 128 0,781	26 104 0,961	22 88 1,136								
15	38 152 0,657	44 176 0,568	44 176 0,568	36 144 1,785																			
16	50 200 0,500	26 104 0,961	36 144 0,694	20 80 1,250	30 120 0,833	14 56 1,785	31 124 0,807	38 152 0,657	26 104 0,961	32 128 0,781	29 116 0,862	51 204 0,490	31 124 0,807	34 136 0,735	26 104 0,961	35 140 0,961	42 168 0,714	32 128 0,593	28 112 0,781	25 100 0,893	28 112 0,893	40 160 0,625	25 100 1,000
17	45 180 0,555	23 92 1,086	18 72 1,388	12 48 2,083	35 144 0,714	36 144 0,694	45 180 0,555	42 168 0,593	51 200 0,490	50 200 0,500	37 148 0,675	47 188 0,532	31 124 0,807	42 168 0,593	27 108 0,926	48 192 0,521	84 336 0,296	38 152 0,657	24 96 1,041	30 120 0,833			

Tabelle II.

Sol 2 = 192 Schw.

	62	48	50	46	52	35	25	35	42										
1	372	288	300	276	312	210	150	210	252										
	0,268	0,347	0,333	0,362	0,320	0,476	0,666	0,476	0,397										
	45	31	32	27	36	26	50	34	52	36	70	38	30	28	24				
2	270	186	192	162	216	156	300	204	312	216	420	228	180	168	144				
	0,370	0,537	0,521	0,617	0,463	0,641	0,333	0,490	0,320	0,463	0,238	0,438	0,555	0,595	0,694				
	32	46	50	59	32	25	32	27	25	40									
3	192	276	300	354	192	150	192	162	150	240									
	0,521	0,362	0,333	0,284	0,521	0,666	0,521	0,617	0,666	0,417									
	45	50	36	28	31	30	30	28	26										
4	270	300	216	168	186	180	180	168	156										
	0,370	0,333	0,463	0,595	0,537	0,555	0,555	0,595	0,641										
	32	31	36	34	26	31	30	48	35	36	60	42							
5	192	186	216	204	156	186	180	288	210	216	360	252							
	0,521	0,537	0,463	0,490	0,641	0,537	0,555	0,347	0,476	0,463	0,277	0,397							
	28	28	38	26	30	25	35	24	33	63	28	25	27	54					
6	168	168	228	156	180	150	210	144	198	378	168	150	162	324					
	0,595	0,595	0,438	0,641	0,555	0,666	0,476	0,694	0,505	0,264	0,595	0,666	0,617	0,308					
	30	45	28	31	50	26	32	42	37	24	62	26							
7	180	270	168	186	300	156	192	252	222	144	372	156							
	0,555	0,370	0,595	0,537	0,333	0,641	0,521	0,397	0,450	0,694	0,268	0,641							
	50	31	32	50	26	60	70	48	68	56									
8	300	186	192	300	156	360	420	288	408	336									
	0,333	0,537	0,521	0,333	0,641	0,277	0,238	0,347	0,245	0,297									
	62	32	29	42	56	75	24	22	36										
9	372	192	174	252	336	450	144	132	216										
	0,268	0,521	0,574	0,397	0,297	0,222	0,694	0,757	0,463										
	62	25	27	26	60	25	30	32	40	86	32	56	32	60					
10	372	150	162	156	360	150	180	192	240	516	192	336	192	360					
	0,268	0,666	0,617	0,641	0,277	0,666	0,555	0,521	0,417	0,195	0,521	0,297	0,521	0,277					
	63	28	30	35	80	28	80	28	56	42	29	25							
11	378	168	180	210	480	168	480	168	336	252	174	150							
	0,264	0,595	0,555	0,476	0,208	0,595	0,208	0,595	0,297	0,397	0,574	0,666							
	36	70	37	32	52	40	50	80	82	92	82	34	28						
12	216	420	222	192	312	240	300	480	492	552	492	204	188						
	0,463	0,238	0,450	0,521	0,320	0,417	0,333	0,208	0,203	0,181	0,203	0,490	0,595						
	60	30	42	38	34	65	70	80	72	35	32	35	26						
13	360	180	252	228	204	390	420	480	432	210	192	210	156						
	0,277	0,555	0,397	0,438	0,490	0,256	0,238	0,208	0,231	0,476	0,521	0,476	0,641						
	36	45	58	36	48	56	38	30	37	28	44	122	35	130	52				
14	216	270	348	216	288	336	228	180	222	168	264	732	210	780	312				
	0,463	0,370	0,287	0,463	0,347	0,297	0,438	0,555	0,450	0,595	0,378	0,136	0,476	0,128	0,320				
	70	63	36	38	40	36	41	34	46	50	62	38	70	28					
15	420	378	216	228	240	216	246	204	276	300	372	228	420	168					
	0,238	0,264	0,463	0,438	0,417	0,463	0,405	0,490	0,363	0,333	0,268	0,438	0,238	0,595					
	80	102	32	28	61	60	60	65	98	56	85								
16	480	612	192	168	366	360	360	390	588	336	210								
	0,208	0,153	0,521	0,595	0,273	0,277	0,277	0,256	0,170	0,297	0,476								

